PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Cipralex®
Comprimés d'oxalate d'escitalopram
Cipralex MELTZ®
Comprimés orodispersibles d'escitalopram

Ce dépliant – qui est la troisième et dernière partie d'une « monographie de produit » publiée à la suite de l'approbation de la vente de Cipralex® au Canada – a été conçu expressément pour les consommateurs. Veuillez le lire avant de commencer à prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ® et conservez-le pendant votre traitement au cas où vous voudriez le relire. Ce dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents sur Cipralex ou Cipralex MELTZ®. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien. Gardez toujours les médicaments hors de la portée des enfants.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Raisons d'utiliser ce médicament :
Votre médecin vous a prescrit Cipralex ou Cipralex MELTZ pour soulager vos symptômes de dépression, d'anxiété, ou de trouble obsessionnel-compulsif. **Un traitement par ce type de médicament est des plus sûrs et des plus efficaces lorsqu'il y a une bonne communication avec le médecin traitant et que celui-ci sait vraiment comment vous vous sentez.**

Effets de ce médicament :
Cipralex et Cipralex MELTZ sont des antidépresseurs qui font partie d'une classe de médicaments appelés ISRS ou inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine.

On croit que Cipralex et Cipralex MELTZ agissent en augmentant le taux d'une substance chimique présente dans le cerveau appelée sérotonine (5-hydroxytryptamine). On considère que la perturbation du système sérotoninergique compte pour beaucoup dans l'apparition de la dépression et des maladies apparentées.

Circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :
- Ne prenez pas Cipralex ou Cipralex MELTZ en même temps que le pimozide.
- Ne prenez pas Cipralex ou Cipralex MELTZ si vous prenez actuellement ou avez pris récemment un antidépresseur de la classe des inhibiteurs de la monoamine oxydase (p. ex., sulfate de phénelzine, moclobémide).
- Vous ne devez pas prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ si vous y êtes allergique ou si vous êtes allergique à l'un de leurs ingrédients (voir la liste des ingrédients énumérés aux sections « Ingrédient médicinal » et « Ingrédients non médicinaux »).
- Cessez de prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ et communiquez immédiatement avec votre médecin si vous manifestez une réaction allergique ou toute réaction indésirable grave.
- Ne prenez pas Cipralex ou Cipralex MELTZ si vous avez reçu un diagnostic de syndrome du QT long congénital.

Ingrédient médicinal :
Comprimés de Cipralex : Oxalate d'escitalopram
Comprimés orodispersibles de Cipralex MELTZ : Escitalopram libre

Ingrédients non médicinaux :
Comprimés de Cipralex :
Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, dioxyde de silice colloïdale, dioxyde de titane (blanc E-171), hydroxypropyl méthyl cellulose, polyéthylèneglycol 400, stéarate de magnésium, talc.
Comprimés orodispersibles de Cipralex MELTZ :
Acide citrique anhydre, arôme de menthe (naturel et artificiel), cellulose microcristalline, copolymère de méthacrylate de diméthylaminoéthyle, butyle et méthyle, crospovidone, hydrogénocarbonate de sodium, hypromellose, mannitol, stéarate de magnésium, sucralose (E955).

Formes posologiques :
Comprimés de Cipralex :
Comprimés blancs de 10 mg et 20 mg en plaquettes alvéolées ou en bouteilles.
Comprimés orodispersibles de Cipralex MELTZ :
Comprimés blanc à blanc cassé légèrement tacheté de 10 mg ou de 20 mg en plaquettes alvéolées.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Un traitement par ce type de médicament est des plus sûrs et des plus efficaces lorsqu'il y a une bonne communication avec le médecin traitant et que celui-ci sait vraiment comment vous vous sentez.

Cipralex et Cipralex MELTZ ne sont pas indiqués chez les patients de moins de 18 ans.

Apparition ou aggravation de problèmes émotifs ou comportementaux
Surtout au cours des premières semaines ou lorsqu'on ajuste la dose, un petit nombre de personnes prenant ces médicaments peuvent se sentir moins bien plutôt que mieux. Elles peuvent se sentir agitées, hostiles, anxieuses ou impulsives, ou avoir des idées suicidaires, d'automutilation ou de comportement agressif envers les autres : ces problèmes peuvent être nouveaux ou être déjà présents mais aggravés. Les idées et comportements suicidaires surviennent à n'importe quel âge, mais les patients de 18 à 24 ans sont probablement plus à risque. Si cela vous arrive ou arrive à la personne dont vous vous occupez, **consultez un médecin immédiatement.** L'étroite surveillance d'un médecin s'impose en pareil cas. **Ne prenez pas vous-même la décision d'arrêter de prendre votre médicament.**

Ces pensées risquent davantage de surgir si vous avez déjà envisagé de vous faire du mal.

Il serait peut-être bon de parler de votre dépression ou de votre anxiété à un proche ou à un ami, et de l'inviter à lire le présent

dépliant. Vous pourriez aussi lui demander de vous avertir s'il perçoit une aggravation de votre état ou s'inquiète d'un éventuel changement de comportement.

Effets sur la grossesse et les nouveau-nés

Si vous prenez Cipralex ou Cipralex MELTZ et venez d'apprendre que vous êtes enceinte, informez-en immédiatement votre médecin. Si vous planifiez une grossesse, vous devriez également consulter votre médecin.

Complications possibles à la naissance (de la prise d'un antidépresseur de nouvelle génération, dont Cipralex et Cipralex MELTZ) :

Après la commercialisation, quelques nouveau-nés dont la mère avait pris un ISRS (inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine) comme Cipralex, Cipralex MELTZ ou un autre antidépresseur de nouvelle génération pendant la grossesse ont eu des complications à la naissance qui ont nécessité une hospitalisation prolongée, un soutien respiratoire et une alimentation par gavage. Les symptômes signalés étaient les suivants : difficultés à s'alimenter et/ou à respirer, peau bleuâtre, crises convulsives, variation de la température corporelle, vomissements, faible taux de sucre dans le sang, tension ou relâchement excessif des muscles, réflexes vifs, tremblements, énervement, irritabilité, léthargie, somnolence, difficulté à dormir et pleurs constants. Dans la plupart des cas, l'antidépresseur de nouvelle génération avait été pris pendant le troisième trimestre de la grossesse. Ces symptômes témoignent d'un effet défavorable direct sur le bébé ou possiblement d'un syndrome de retrait causé par un arrêt soudain de l'exposition au médicament. En général, ces symptômes se résorbent au fil du temps. Cela dit, si votre bébé montre n'importe lequel de ces symptômes, communiquez avec votre médecin le plus tôt possible.

Hypertension artérielle pulmonaire persistante (HTAPP) et antidépresseurs de nouvelle génération :

La prise de médicaments comme Cipralex ou Cipralex MELTZ pendant la grossesse, surtout pendant les 3 derniers mois, peut augmenter le risque d'apparition d'une maladie pulmonaire grave chez le bébé, appelée *hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né* (HTAPPN). Cette maladie provoque, peu après la naissance, des difficultés respiratoires chez le nouveau-né qui, dès lors, respire rapidement et prend une teinte bleuâtre. Ces symptômes apparaissent généralement dans les 24 heures suivant la naissance. S'ils se manifestent, vous devez communiquer immédiatement avec votre médecin.

Si vous êtes enceinte et prenez un ISRS ou un autre antidépresseur de nouvelle génération, vous devriez discuter des risques et des avantages des diverses options de traitement qui s'offrent à vous avec votre médecin. Il est essentiel que vous NE cessiez PAS de prendre ces médicaments sans d'abord en parler à votre médecin.

Risque de fracture osseuse :

Prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ peut augmenter votre risque de fracture si vous êtes âgé, atteint d'ostéoporose ou particulièrement vulnérable aux fractures osseuses. Vous devez faire très attention pour éviter les chutes, en particulier si vous avez des étourdissements ou si votre pression sanguine est basse.

Avant de prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ, voici ce que vous devez dire à votre médecin :

- tous vos problèmes médicaux, y compris les problèmes cardiaques, les antécédents de crises épileptiques, le trouble bipolaire (psychose maniaco-dépressive), les maladies du foie ou du rein ou le diabète.
- antécédents personnels de troubles hémorragiques ou d'un faible taux de plaquettes.
- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux d'allongement de l'intervalle QT/QTc;
- si vous avez des antécédents personnels d'évanouissements;
- si vous avez des antécédents familiaux de mort subite cardiaque à < 50 ans;
- si vous avez des antécédents personnels de déséquilibres électrolytiques (p. ex., faibles taux sanguins de potassium, de magnésium ou de calcium) ou de problèmes qui pourraient causer des déséquilibres électrolytiques (p. ex., vomissements, diarrhée, déshydratation);
- si vous avez des antécédents personnels d'un trouble alimentaire ou régime alimentaire strict;
- si vous souffrez de glaucome ou présentez une élévation de la pression dans les yeux;
- une fracture osseuse récente, l'ostéoporose ou les facteurs de risque d'ostéoporose
- si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, ou si vous allaitez;
- si vous recevez un traitement par électrochocs;
- tous les médicaments (sur ordonnance ou en vente libre) que vous prenez ou que vous avez pris au cours des 14 derniers jours, surtout les inhibiteurs de la monoamine oxydase, le pimozide, tout autre antidépresseur, les triptans (antimigraineux), le lithium, le tramadol ou des médicaments contenant du tryptophane;
- si vous avez déjà eu une réaction allergique à un médicament ou à l'un des ingrédients énumérés dans ce dépliant;
- vos habitudes de consommation d'alcool et/ou de drogues;
- les produits naturels ou à base d'herbes médicinales que vous prenez (p. ex., le millepertuis);
- si vous conduisez un véhicule ou effectuez des tâches dangereuses dans le cadre de votre travail.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Interactions médicamenteuses graves

Ne prenez pas Cipralex ou Cipralex MELTZ si vous prenez ou avez pris récemment :

- Un inhibiteur de la monoamine oxydase (p. ex., phénelzine, tranylcypromine, moclobémide ou sélégiline)
- Du pimozide
- Du linézolide (antibiotique)
- Du bleu de méthylène (par voie intraveineuse)

La liste ci-après des médicaments qui pourraient augmenter le risque d'effets secondaires pendant que vous prenez Cipralex ou Cipralex MELTZ est partielle et non exhaustive. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un autre médicament (sur ordonnance, en vente libre ou à base de plantes médicinales) en même temps que Cipralex ou Cipralex MELTZ.

Autres médicaments susceptibles d'interagir avec Cipralex :

- Médicaments qui traitent les troubles du rythme cardiaque (antiarythmiques)
- Antipsychotiques
- Opioïdes contre la douleur
- Médicaments contre les infections
- Diurétiques (médicaments qui font uriner)
- Laxatifs (incluant les lavements)
- Autres ISRS (citalopram) ou tout autre antidépresseur (par exemple, l'imipramine ou la désipramine)
- Lithium
- Tryptophane
- Cimétidine
- Triptans (p. ex., sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan)
- Fluconazole
- Kétoconazole
- Itraconazole
- Citalopram (racémate) (Celexa)
- Warfarine
- Oméprazole
- Toute plante médicinale comme le millepertuis
- Certains médicaments pouvant agir sur la coagulation sanguine et augmenter les saignements, tels que les anticoagulants oraux (p. ex., warfarine, dabigatran), l'acide acétylsalicylique (p. ex., Aspirin) et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (p. ex., ibuprofène).
- Certains médicaments visant à soulager la douleur, comme le fentanyl (employé en anesthésie ou pour atténuer la douleur chronique), le tramadol, le tapentadol, la mépéridine, la méthadone et la pentazocine.
- Certains médicaments employés pour calmer la toux, comme le dextrométhorphane.

Évitez de consommer de l'alcool pendant le traitement par Cipralex ou Cipralex MELTZ.

Les médicaments de la même classe que Cipralex et Cipralex MELTZ peuvent accroître le risque de saignement, comme les saignements de nez, les « bleus » et même les hémorragies mortelles. Ce risque est encore plus élevé si vous avez des antécédents de trouble de la coagulation ou si vous prenez un médicament qui agit sur les plaquettes.

L'administration d'un ISRS chez un patient diabétique peut modifier le contrôle glycémique (hypoglycémie et hyperglycémie).

Informez votre médecin de tous les médicaments (sur ordonnance ou en vente libre) et produits de santé naturels que vous prenez ou pensez prendre.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle :

- Il est essentiel que vous suiviez les directives de votre médecin à la lettre lorsque vous prenez Cipralex ou Cipralex MELTZ.

- En général, le médecin prescrit 10 mg/jour, que vous devez prendre en une seule dose, de préférence à la même heure chaque jour. Si vous êtes une personne âgée, le médecin pourrait vous prescrire une dose plus faible. Cette dose peut être augmentée. Ne modifiez jamais votre dose de Cipralex ou Cipralex MELTZ ni celle d'une personne que vous aidez, sauf à la demande du médecin.

- Vous devez continuer de prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ même si vous ne notez pas d'amélioration de votre état, car il peut s'écouler plusieurs semaines avant que le médicament n'agisse. L'amélioration peut être graduelle.

- Continuez de prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ tant que votre médecin vous le recommande. N'arrêtez pas de prendre le médicament brusquement même si vous commencez à vous sentir mieux, à moins que votre médecin ne l'exige. Votre médecin pourrait vous recommander de continuer à prendre Cipralex ou Cipralex MELTZ pendant plusieurs mois. Continuez de suivre les directives de votre médecin.

Mode d'emploi

Comprimés de Cipralex :

- Prenez la dose prescrite une fois par jour.
- Avalez le(s) comprimé(s) en entier avec de l'eau. Ne le(s) mâchez pas. Cipralex peut se prendre avec ou sans nourriture.

Comprimés orodispersibles de Cipralex MELTZ :

- Prenez la dose prescrite une fois par jour.
- Cipralex MELTZ peut se prendre avec ou sans nourriture.
- Les comprimés de Cipralex MELTZ étant friables, il faut les manipuler délicatement. Ne manipulez pas les comprimés de Cipralex MELTZ avec les mains mouillées, car ils risquent de se désintégrer.

Suivez les directives ci-dessous, dans l'ordre des pictogrammes :

1. Tenez la bande alvéolée par son pourtour et séparez une alvéole des autres en la détachant délicatement suivant les lignes perforées qui l'entourent.



2. Soulevez délicatement la pellicule protectrice.



3. Placez le comprimé sur la langue. Le comprimé se dissoudra rapidement et vous pourrez l'avaler sans eau.

Surdose :

- Si, par accident, vous avez ingéré une trop grande quantité de Cipralex ou de Cipralex MELTZ, communiquez immédiatement avec votre médecin, votre centre antipoison régional ou le service des urgences de l'hôpital le plus près de chez vous, même si vous ne vous sentez pas malade. Si vous allez chez le médecin ou à l'hôpital, emportez votre provision de Cipralex ou Cipralex MELTZ avec vous. La prise d'une surdose peut entraîner, notamment, les signes suivants : étourdissements, tremblements, agitation, convulsions, coma, nausées, vomissements, changement du rythme cardiaque, baisse de la tension artérielle et crises convulsives.

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de la région, même si vous n'avez aucun symptôme.

Dose oubliée :
Si vous oubliez une dose, prenez la dose suivante au moment habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser.

QUE FAIRE EN CAS D'EFFETS SECONDAIRES

- Cipralex et Cipralex MELTZ peuvent entraîner des effets indésirables (effets secondaires). Voici la liste des effets indésirables possibles : nausées, transpiration excessive, diarrhée, fatigue, fièvre, constipation, congestion nasale ou écoulement nasal, problèmes de sommeil, perte d'appétit, augmentation de l'appétit, prise de poids, diminution du désir sexuel, diminution de la capacité à atteindre l'orgasme, dysfonction érectile, anxiété, agitation, rêves anormaux, difficultés à s'endormir, envie de dormir, bâillements, tremblements, picotements, étourdissements, sécheresse de la bouche, brûlures d'estomac, douleurs musculaires et articulaires, douleurs à l'estomac et changement de la fréquence cardiaque.

- Communiquez avec votre médecin avant de mettre fin à votre traitement par Cipralex ou Cipralex MELTZ ou d'en réduire la dose. Divers symptômes (par exemple, étourdissements, rêves inhabituels, sensation de chocs électriques, agitation, anxiété, indifférence émotionnelle, difficultés de concentration, maux de tête, migraines, tremblements, nausées, vomissements, transpiration ou autres symptômes) peuvent survenir à l'arrêt du traitement ou après une diminution de la dose d'escitalopram. Ces symptômes peuvent aussi se produire si vous oubliez de prendre une dose. En général, ils disparaissent sans traitement. Prévenez votre médecin immédiatement si vous avez ces symptômes ou tout autre symptôme. Votre médecin pourrait alors ajuster la posologie d'escitalopram afin d'atténuer vos symptômes.

- Souvent, les effets indésirables sont d'intensité légère et disparaissent après quelques jours. S'ils sont incommodants ou s'ils persistent, ou si vous éprouvez d'autres réactions défavorables inhabituelles pendant votre traitement par Cipralex ou Cipralex MELTZ, consultez votre médecin.

- En général, Cipralex ou Cipralex MELTZ ne modifient aucunement votre capacité à vaquer à vos activités quotidiennes habituelles. Cependant, il est préférable de ne pas conduire de voiture ni de faire fonctionner de l'équipement lourd tant que vous n'avez pas la certitude que la prise de Cipralex ou de Cipralex MELTZ n'entraîne pas d'effets négatifs sur vous.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE

Symptôme / effet		**Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien**		**Consultez un médecin de toute urgence**
		Seulement pour les effets secondaires graves	**Dans tous les cas**	
Peu fréquents	**Faible taux de plaquettes :** Ecchymoses (bleus) ou saignements inhabituels de la peau ou d'autres régions		√	
	Hallucinations : Visions ou sons étranges		√	

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE				
Symptôme / effet		**Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien**		**Consultez un médecin de toute urgence**
		Seulement pour les effets secondaires graves	**Dans tous les cas**	
	Incapacité d'uriner		√	
	Manie : Hyperactivité du comportement et des pensées		√	
	Modification du contrôle du sucre sanguin chez les patients diabétiques : Diminution du taux de sucre dans le sang (symptômes : étourdissements, manque d'énergie, envie de dormir, maux de tête, tremblement ou transpiration) ou augmentation du taux de sucre dans le sang (symptômes : plus grande soif, envie d'uriner plus fréquente, faiblesse, confusion, haleine fruitée)		√	
	Mouvements incontrôlables du corps ou du visage		√	
	Réactions allergiques : Rougeur, urticaire, démangeaisons, enflure des lèvres, du visage, de la langue, de la gorge, difficulté à respirer, respiration sifflante, essoufflement, éruptions cutanées, ampoules, plaies ou douleurs au niveau de la bouche ou des yeux			√

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE				
Symptôme / effet		**Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien**		**Consultez un médecin de toute urgence**
		Seulement pour les effets secondaires graves	**Dans tous les cas**	
	Réactions allergiques : Éruptions cutanées seulement, urticaire seulement		√	
Rares	**Faible taux de sodium dans le sang :** Symptômes de fatigue, faiblesse, confusion s'accompagnant de douleur, raideur ou incoordination musculaires		√	
	Glaucome : Élévation de la pression oculaire, douleur oculaire et vision floue		√	
	Syndrome sérotoninergique : Combinaison de l'ensemble ou d'une partie des symptômes suivants: agitation, confusion, tremblements, secousse musculaire, fièvre			√
Très rares	**Crises convulsives :** Perte de conscience s'accompagnant de tremblements incontrôlables			√
	Trouble du foie : Symptômes comprenant nausées, vomissements, perte d'appétit s'accompagnant de démangeaisons, jaunissement de la peau ou des yeux, urines foncées			√

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE

Symptôme / effet		Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien		Consultez un médecin de toute urgence
		Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
	Saignements gastrointestinaux: Vomissements de sang ou sang dans les selles			√
Voir la section Mises en garde et précautions	**Akathisie :** Sensation d'agitation et incapacité de rester assis ou debout sans bouger		√	
	Apparition ou aggravation de problèmes émotifs ou comportementaux		√	
Fréquence inconnue	**Fréquence ou rythme cardiaque anormal(e), palpitations, évanouissement**		√	

Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Si vous avez un effet secondaire inattendu, quel qu'il soit, pendant que vous prenez ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

- Comme tout autre médicament, Cipralex ou Cipralex MELTZ doit être gardé hors de la portée et de la vue des enfants.
- Conservez vos comprimés de Cipralex à la température ambiante (15 à 30 °C), dans un endroit sec, et assurez-vous que le flacon est fermé hermétiquement. Conservez vos comprimés orodispersibles de Cipralex MELTZ dans un endroit sec, dans leur emballage d'origine afin de les protéger de la lumière, et à une température variant entre 15 et 30 °C.
- Vous verrez une date de péremption sur l'étiquette. Passé cette date, ne prenez pas votre médicament.
- Si votre médecin vous demande de mettre fin à votre traitement, vous devriez retourner les comprimés restants au pharmacien, à moins que votre médecin ne vous recommande de garder les comprimés à domicile.

N'OUBLIEZ PAS : Ce médicament est pour VOUS. Seul un médecin peut le prescrire. Par conséquent, n'offrez-le jamais à une autre personne, même si les symptômes de cette personne semblent identiques aux vôtres.

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes :

- **En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet**
- **Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345**
- **En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :**
  - **par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789, ou**
  - **par la poste, au : Programme Canada Vigilance**
    Santé Canada
    Indice postal 0701E
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet[MC] Canada à www.santecanada.gc.ca/medeffet.

NOTE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

On peut trouver ce document et la monographie complète du produit, rédigés pour les professionnels de la santé, en communiquant avec le promoteur, Lundbeck Canada Inc., au : 1-800-586-2325

Licencié/Distributeur :

Lundbeck Canada Inc.
1000, rue De La Gauchetière Ouest,
bureau 500
Montréal (Québec)
H3B 4W5 Canada

Lundbeck Canada Inc. a rédigé ce dépliant.
Dernière révision: 13 août 2012